


O QUE É O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO?

É um tumor que se desenvolve na parte inferior do útero, conhecido como 'colo', que fica localizado no fundo da vagina.




O QUE CAUSA A DOENÇA?

O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero é a infecção pelo papilomavírus humano conhecido como **HPV**. Sua transmissão se dá principalmente pela relação sexual.

Grande parte da população terá contato com o HPV durante a vida e a maioria dos homens e mulheres acabam eliminando a infecção espontaneamente. Caso a infecção persista, há risco do surgimento de lesões no colo chamadas de precursoras que se não tratadas adequadamente podem evoluir a longo prazo com o surgimento do câncer.

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS?

No início, sobretudo na fase de lesões precursoras, normalmente não há sintomas e as mulheres não se queixam de alterações. Com a evolução da doença podem surgir sangramento vaginal anormal (inclusive após as relações sexuais), corrimento persistente com odor desagradável e alterações urinárias e/ou intestinais muitas vezes acompanhadas de dor na região inferior do abdome e pelve.




Outros fatores quando associados a infecção pelo HPV podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença.

Entre esses fatores os principais são **tabagismo** e presença de outras **infecções sexualmente transmissíveis**, como o **HIV** por exemplo.

COMO PREVENIR?

Há 2 principais formas de prevenção: a **vacinação** e os **testes de rastreamento de rotina**. A vacina contra o HPV apresenta melhores resultados quando administrada aos jovens antes dos 15 anos, mas pode ser indicada para homens e mulheres entre 9 e 45 anos. Pelo SUS, a vacina está disponível gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos em esquema de dose única nos postos de vacinação das unidades básicas de saúde.



Para a identificação de lesões causadas pelo HPV a recomendação é a realização dos testes preventivos periódicos. **Mulheres** entre **25 e 64 anos** devem realizar o exame de Papanicolaou inicialmente a cada ano e após 2 testes negativos podem passar a fazer a cada 3 anos. Na disponibilidade de testes moleculares que fazem a detecção do HPV esses podem substituir o exame de Papanicolaou e o intervalo de realização poderá ser aumentado.



MULHER, se você tem de **25 a 64** anos de idade, faça seu exame preventivo. Em caso de surgimento de sinais e sintomas, procure seu médico(a) de confiança o quanto antes.

Verifique entre os meninos e meninas da sua família se estão devidamente **vacinados** contra o vírus **HPV**.



ha
HOSPITAL DE AMOR

www.hospitaldeamor.com.br


f /ohospitaldeamor
@ hospitaldeamor
X @hospitaldeamor
▶ /hospitaldeamor
d @hospitaldeamor
in /hospitaldeamor

MARÇO
LILÁS
mês de prevenção
do câncer do colo
do útero

Prevenção
é o **Ang**
Toda

MARÇO
LILÁS

mês de prevenção
do câncer do colo
do útero



ha
HOSPITAL DE AMOR

Prevenção
é o **Ang**
Toda